




Pombo-da-madeira *Columba trocaz* (paloma de Madeira, Trocaz Pigeon). 42-45 cm. É endêmico da Madeira. Faz lembrar um pombo-torcaz grande, com as asas mais curtas e sem as características marcas brancas. Possui uma mancha prateada no pescoço. O uropígio é escuro, tal como o dorso.

A cauda tem uma barra terminal preta e uma barra sub-terminal cinzento-clara. O peito é rosado. A iris é pálida. Emite chamamentos parecidos com os do pombo-torcaz, mas mais fracos. ♦ Frequenta zonas de altitude com floresta laurissilva. Alimenta-se de frutos. Nidifica ao longo de todo o ano, mas em especial Fev.-Jun. Os ninhos são instalados em cavidades rochosas inacessíveis e em grutas; raramente em árvores. ♦ É resid. ♦ É pouco comum a comum (~7000 aves); **VU**.



Rola-turca *Streptopelia decaocto* (tortola turca, Eurasian Collared Dove). ~32 cm. É maior e tem a cauda mais comprida do que a rola-brava; tem coloração castanho-clara com áreas cinzentas e outras algo rosadas ou cor-de-vinho. Tem um "colar" interrompido preto, fino, que está ausente nos juvs. As retrizes são brancas com base preta. Confunde-se com as rolas domésticas escapadas ou assilvestradas (rola-de-colar, variedade da rola-rosada *S. roseogrisea*) que são muito parecidas, ainda que menores, mais pálidas e uniformes (sem o tom rosado no peito, com coberturas infracaudais mais brancas e com pouco preto na base da cauda) e que emitem sons diferentes: a rola-turca emite um insistente *cú-cú-cú* (como *de-caoc-toj*) e a rola doméstica um suave *cu-cruu*; o chamamento de "excitação" é um nasal e arreganhado *gáá* na rola-turca e uma "gargalhada" *jek-kek-kek* na outra. ♦ Frequenta zonas urbanas ocorrendo em parques, jardins, portos, cemitérios (atraem-na os ciprestes, cedros e outras coníferas). ♦ É resid. e dispersiva. ♦ É comum e está em expansão (dezenas de milhares de casais). É mais frequente ao longo da faixa litoral. As primeiras observações tiveram lugar na década de 1970. ♦ É resid. rara nos Açores (primeira observação em 2006) onde nidifica ocasionalmente. É acid. na Madeira e nas Selvagens.



Rola-brava *Streptopelia turtur* (tortola europeia, European Turtle Dove). ~27 cm. É estival e muito atractiva. É cerca de 20% mais pequena do que a rola-turca e muito mais escura e contrastada. As penas dorsais têm centros escuros e amplas orlas arriçadas. As grandes coberturas são acinzentadas. Tem marcas peculiares nos lados do pescoço. A cauda é escalonada, preta com bordo branco. Os juvs. são acastanhados e não têm marcas no pescoço. Emite um arrulho monótono e adormecedor *turr-turr*, *turr-turr*. É vista com frequência aos pares ou em pequenos bandos. ♦ Frequenta campinas arborizadas, sotos, montados, olivais, laranjais. Nidifica em árvores ou arbustos. Visita campos de girassol, cereais e bebedouros. ♦ É estival, transaariana, de chegada tardia. Há também alguma pass. de aves europeias (Abr.-Jun. e Ago.-Out.). ♦ É pouco comum a comum (dezenas de milhares de casais?); parece ser mais abund. no NE. ♦ É acid. nos Açores. É mig. pass. muito rara na Madeira onde poderá por vezes nidificar. É mig. pass. rara nas Selvagens.

Pombo-da-madeira



Rola-turca



Rola-brava

