

CONGO

PHYTOGÉOGRAPHIE


ECHELLE : 1 : 2 000 000

Km 10 0 50 100 150 200 Km

LÉGENDE

- FORMATIONS BASSES HYGROPHILES OU AQUATIQUES**
- Prairie flottante
 - Papyrus
 - Marais et steppes marécageuses
- FORMATIONS ARBORESCENTES HAUTES FERMÉES**
- Forêt inondée
 - Forêt ombrophile équatoriale
 - Forêt littorale
 - Forêt ombrophile claire
 - Forêt mésophile
- FORMATIONS HERBEUSES HAUTES FERMÉES**
- Savane à Hyparrhenia forme sans Hymenocardia
 - Savane à Hyparrhenia forme avec Hymenocardia
- FORMATIONS HERBEUSES HAUTES OUVERTES**
- Savane à Aristida forme à Loudetia
 - Savane à Aristida forme à Pobeguinea
 - Savane à Aristida forme typique
 - Savane à Loudetia demeusii
 - Savane à Trachypogon et Hyparrhenia
 - Savane à Trachypogon forme appauvrie
 - Savane à Andropogon
- FORMATIONS HERBEUSES BASSES OUVERTES**
- Steppes loussékés
 - Steppes littorales

Les baguettes indiquent la coexistence de deux types de végétation dont l'importance relative est approximativement traduite par l'épaisseur variable de ces baguettes



LIMITES
ARBITRAIRES

Sources

Sud du Congo : J. KOECHLIN : diverses publications et
"La végétation des savanes dans le sud... du Congo"
(carte : Esquisse de la végétation dans le sud du Congo).

Centre : B. DESCOINGS : rapports et esquisses cartographiques inédits.

Nord : B. ROLLET : carte des types de végétation de la cuvette congolaise.